



Armando Piccinini

Regolamento di Polizia Urbana e Rurale di Alvito e Posta, approvato dal Decurionato di Alvito il 3 aprile 1819.

... Resta vietata la pesca delle trote ne' mesi di gennaio, febbraio, e marzo e la pesca de' carpioni nel locale detto Grotta de' Carpioni ne' mesi di settembre, ed ottobre, epoca in cui accade la deposizione, e fecondazione delle uova. Saranno perciò puniti coll'ammenda di Ducati sei, e tre giorni di prigionia tutti coloro che pescheranno ne' detti mesi di proibizione, procedendosi contro di essi a termine della legge...

RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO
Contrada Carpello s.n.c., - 03030 Posta Fibreno (FR)
www.parchilazio.it/postafibreno
mail: riservapostafibreno@regione.lazio.it
tel. 0776 888021 - 0776 887276



Il Carpione del Fibreno

Salmo fibreni



disegni di Titti De Ruosi



RISERVA NATURALE
LAGO DI POSTA FIBRENO



REGIONE
LAZIO


Il Carpione del Fibreno è una specie di grandissimo interesse faunistico, in quanto endemica nel Lago di Posta Fibreno (ciò significa che vive solo qui e in nessun'altra parte del mondo). Nonostante fosse noto alla comunità locale da secoli, anche perché oggetto di pesca, è stato descritto solo nel 1990 come specie a sé stante, a cui è stato dato il nome scientifico di *Salmo fibreni*. Si tratta di un pesce di piccola taglia, che svolge l'intero ciclo vitale nel lago e nel piccolo immissario Rio Dova. Occupa le parti più profonde del bacino e quelle prossime alle sorgenti, direttamente in comunicazione con il sistema carsico sotterraneo. Mostra una preferenza per le aree povere di luce e questo comportamento, insieme ad altri elementi noti da tempo ai pescatori locali, fanno ipotizzare abitudini parzialmente cavernicole (comportamento eccezionale nell'ittiofauna europea). La sua taglia è tra le più piccole all'interno della famiglia Salmonidae, raggiungendo normalmente 17-18 cm di lunghezza e 60-70 g di peso. È una specie la cui etologia ancora ha molto da rivelare ed è adatta solo alle peculiari caratteristiche del lago di Posta Fibreno, che presenta un ciclo vitale breve, probabilmente solo di due o tre anni. Si riproduce su fondali ghiaiosi e pietrosi e presenta una stagione riproduttiva molto lunga (altro fatto eccezionale per la famiglia zoologica a cui appartiene): da ottobre ad aprile, con un picco tra dicembre e gennaio. È minacciata dalle alterazioni dell'habitat e in particolare della comunità biotica di cui è parte.



Armando Piccinini

Le principali differenze tra il carpione del Fibreno e la trota macrostigma risultano ben distinguibili sulla base di alcuni caratteri morfologici:


Salmo (trutta) macrostigma



disegni di Titti De Ruosi

da 9 a 13 macchie ellissoidali grigie lungo i fianchi, spesso sdoppiate o frammentate; più di 20 piccole macchie nere sul corpo, identificano la trota macrostigma;

Salmo fibreni



disegni di Titti De Ruosi

da 7 a 9 macchie ellissoidali grigie lungo i fianchi, mai sdoppiate o frammentate; 10-20 piccole macchie sul copero, in parte nere e in parte bruno-violaceo identificano il Carpione del Fibreno